CLINIQUE DENTAIRE SPÉCIALISÉE des Drs RUSSON et Dr DUMAINE
IMPLANTOLOGIE - PARODONTOLOGIE - ENDODONTIE - ESTHÉTIQUE
192 Rue Grande 77300 FONTAINEBLEAU
Tel. : +33 1 64 22 23 03
selarl-cabinetdentaire-194ruegrande.chirurgiens-dentistes.fr

Les dangers du piercing buccal

Très répandu ces dernières années, particulièrement chez les jeunes de 15 à 25 ans, la mode du piercing buccal suscite de nombreux adeptes.

Moins définitif qu'un tatouage puisque c'est une opération réversible, le piercing est utilisé chez les jeunes soit comme une recherche esthétique, soit comme une manière de se différencier. Le désir d'appartenir à un groupe facilement identifiable est aussi une incitation pour effectuer sur soi-même un piercing.

Moins définitif qu'un tatouage puisque c'est une opération réversible, les piercings sont de réels phénomènes de mode.

Cependant, ils ne sont pas sans dangers.

> « Les piercings buccaux peuvent provoquer une grande variété de complications. »

LES COMPLICATIONS IMMÉDIATES

- Juste après la pose du piercing, peuvent surgir des saignements ou des phénomènes inflammatoires : douleur, gonflement de la langue et / ou des muqueuses percées.
- Augmentation du débit salivaire, difficulté d'élocution, hypersensibilité de la langue.
- Allergies au métal (très fréquentes pour le nickel, plus exceptionnelles pour l'argent).

Mais le danger le plus important est le risque d'infection, car la mise en place du piercing crée une porte d'entrée pour de nombreux germes.

Pendant la cicatrisation, la plaie entretenue par le piercing se comporte comme un lieu de culture microbienne, avec la possibilité d'infections locales ou d'infections à distance graves (problèmes cardio-vasculaires par exemple).

LES COMPLICATIONS À MOYEN ET LONG TERME

- Incrustation excessive du métal.
- Usure et éventuellement fracture dentaire, déplacement des dents lié aux chocs répétés du piercing sur les dents proches.
- Traumatisme de la gencive avec risque de récession gingivale et déchaussement futur des dents.
- Mauvaise cicatrisation avec formation de bourrelets.
- Tics ou troubles de la déglutition dans la durée.
- Risque de complications infectieuse.

À SAVOIR

Le piercing effectué dans la zone buccale ou labiale est loin d'être un geste anodin. Au premier signe d'intolérance, le piercing est à retirer au plus vite.

Source : Webdentiste